

ACRIATE FLO

Insetticida – Acaricida
Emulsione olio / acqua

Composizione su 100 g :

Acrinatrina pura	g	7,01% (pari a 75 g/l)
Coformulanti q.b. a	g	100

Titolare della registrazione

CHEMINOVA A/S - DK-7620 Lemvig, Danemark

Registrazione n. 2000214

Importato dalla Francia da:

COLIA trade S.r.l. – Via G Sisonidi, 53 – 20133 Milano
Tel. 02 45489143

Officina di riconfezionamento / rietichettatura

Denka International B.V. – Barneveld (NL)

Registrazione del Ministero della Salute n. 15504 / IP del 21/09/2012

Taglie: ml 10, 25, 50, 100, 250, 500; Litri 1, 5, 10

Partita n.



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE : P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

REAZIONE : P391 Raccogliere la fuoriuscita.

CONSERVAZIONE : P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFOMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI : EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Prescrizioni supplementari: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Durante l'impiego, in accordo con le corrette norme di applicazione, assicurare la protezione delle vie respiratorie con una maschera idonea (filtro tipo A2/P2 o tipo A2/P3). Applicare il prodotto in assenza di vento e a distanza ragionevole da persone prive di protezione e da animali domestici. Dopo il trattamento, prima di rientrare in campo senza protezione, attendere che il deposito umido sulla vegetazione sia completamente asciugato.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

La sintomatologia tossica nell'animale è caratterizzata da sedazione, ptosi, ipersalivazione e dispnea.

Arrossamenti oculari e disturbi dell'apparato respiratorio dopo inalazione.

Terapia : sintomatica.

Avvertenza : Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

ACRIATE FLO è un insetticida-acaricida in emulsione acquosa particolarmente efficace contro tripidi (*Frankliniella occidentalis*, *Taeniothrips meridionalis*, ecc.); è inoltre attivo contro afidi, cicaline e contro le forme mobili dei più comuni acari fitofagi tetranichidi. ACRIATE FLO agisce per contatto esercitando un'azione rapida e duratura. Per ottenere i migliori risultati è necessario effettuare una bagnatura accurata ed uniforme di tutta la vegetazione. Si consiglia di non effettuare più di 2 trattamenti all'anno su colture arboree e 2 trattamenti per ciclo su colture erbacee.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

VITICOLTURA:

Contro cicaline (*Scaphoideus titanus*, *Empoasca flavescens*, *Zygina rhamnii*) 20-30 ml/hl (0,2-0,3 L/ha) impiegando un volume di acqua di 1.000-1.500 litri per ettaro.

PESCO, SUSINO:

Contro cicaline 20-30 ml/hl (0,2-0,3 L/ha) utilizzando volumi di acqua di 1.000-1.500 litri per ettaro.

ORTAGGI (peperone, melanzana, fagiolo, fagiolino, cipolla) FRAGOLA:

Contro tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*) ed altri tripidi 60 ml/hl (0,3 l/ha) ad inizio infestazione ripetendo il trattamento dopo 4-6 giorni. Effettuare una bagnatura accurata ed uniforme della vegetazione curando particolarmente la zona dei fiori. Distribuire con un volume di 500 litri/ha di acqua.

LATTUGA, CRESCIONE, DOLCETTA, SCAROLA, INDIVIA, CICORIA, RADICCHIO e RUCOLA:

Contro acari, tripidi e afidi 60 ml/hl (0,3 l/ha) alla prima comparsa dell'infestazione, utilizzando un volume di 500 litri/ha di acqua.

COLTURE FLORICOLE ED ORNAMENTALI:

Contro tripide (*Frankliniella occidentalis*) ed altri tripidi 60 ml/hl (0,3 l/ha) ad inizio infestazione ripetendo il trattamento dopo 4-6 giorni.

Contro acari (*Tetranychus urticae*, *Panonychus ulmi*) 60 ml/hl (0,3 l/ha) alla comparsa delle prime forme mobili. In entrambi i casi distribuire ACRIATE FLO con un volume di 500 l/ha di acqua. Effettuare massimo 2 interventi all'anno per coltura o ciclo culturale.

COMPATIBILITA': ACRIATE FLO generalmente si applica da solo; è comunque miscibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari reazione neutra. Si consiglia di fare sempre una prova preliminare su poche piante prima di effettuare applicazioni estese.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture floricole ed ornamentali, è consigliabile effettuare saggi di selettività prima di estendere il trattamento su tutto l'impianto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU PEPERONE E MELANZANA, 7 GIORNI SU PESCO, FAGIOLO, FAGIOLINO, CIPOLLA, FRAGOLA; 14 GIORNI SU LATTUGA, CRESCIONE, DOLCETTA, SCAROLA, INDIVIA, CICORIA, RADICCHIO E RUCOLA; 21 GIORNI SU SUSINO; 30 GIORNI SU VITE.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali;

CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO – DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO – DA NON VENDERSI SFUSO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ACRIATE FLO

Insetticida – Acaricida
Emulsione olio / acqua

Composizione su 100 g :

Acrinatrina pura	g	7,01% (pari a 75 g/l)
Coformulanti q.b. a	g	100

Titolare della registrazione

CHEMINOVA A/S - DK-7620 Lemvig, Danemark

Registrazione n. 2000214**Importato dalla Francia da:**

COLIA trade S.r.l. – Via G Sismondi, 53 – 20133 Milano

Tel. 02 45489143

Officina di riconfezionamento / rietichettatura

Denka International B.V. – Barneveld (NL)

Registrazione del Ministero della Salute n. 15504 / IP del 21/09/2012

Taglie: ml 10, 25, 50, 100

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE : P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

REAZIONE : P391 Raccogliere la fuoriuscita.

CONSERVAZIONE : P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFROMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI : EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



ATTENZIONE

Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE