

# DIMILIN® 25 P.B.

## POLVERE BAGNABILE

Insetticida per ingestione per la difesa di melo e pero, forestali, floreali ed ornamentali e colture di funghi.  
MECCANISMO D'AZIONE: IRAC 15

DIMILIN® 25 P.B. Reg. Ministero della Salute N. 4686 del 25/02/1982

### Composizione

100 gr di prodotto contengono:

Diflubenzuron puro g. 25

Coformulanti q.b.a g.100

Parfita n.

Contenuto: 0,1 - 0,5 - 1 - 5 Kg.

Officina di produzione:

Chemtura Manufacturing Netherlands B.V.

Ankerweg 18 - Amsterdam (Olanda)

### ARYSTA LIFESCIENCE REGISTRATIONS

#### GREAT BRITAIN LIMITED

198 Golden Hillock Road - B11 2PN Birmingham (UK)

Tel. +44 1386 425500

Rappresentata in Italia da:

ARYSTA LifeScience Italia Srl

Sede legale: Via Nino Bixio n. 6 - 44042 Cento (FE) - Tel. 051 6836207

#### DISTRIBUITO DA:

GOWAN ITALIA SpA - Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza - Tel. 0546/629952

ARYSTA LIFESCIENCE ITALIA srl - Via Nino Bixio 6, 44042 Cento (FE) - Tel. 051/6836207

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
**PREVENZIONE:** P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.  
**REAZIONE:** P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.  
**CONSERVAZIONE:** P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.  
**SMALTIMENTO:** P601 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.  
**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

#### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

#### INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

#### CARATTERISTICHE

DIMILIN® 25 P.B. appartiene ad un gruppo di insetticidi di sintesi che inibiscono la deposizione della chitina negli insetti, con conseguente morte in fase di muta. DIMILIN 25 P.B.® è efficace sulle colture agrarie contro i microlepidotteri minatori ed i lepidotteri ricamatori del melo, la Carpocapsa, l'Orgyia e la Psilla del pero. In foresta combatte: Thaumetopoea pityocampa (Processionaria del pino), Lymantria dispar, Rhyacionia buoliana e Pristiphora abietina.

#### MODALITÀ D'IMPIEGO

Dosi per 100 litri di acqua:

#### Frutticoltura (melo e pero):

Contro microlepidotteri minatori (Lithocolletis, Cemiostoma) g. 50-60. Effettuare il trattamento durante la fase di volo degli adulti, in corrispondenza alla ovodeposizione. Contro i lepidotteri ricamatori (Capua, Archips), Carpocapsa, Orgyia g. 80. Trattare durante la deposizione delle uova o in prossimità della loro chiusura. Contro la Psilla del pero g. 80. Effettuare il trattamento alla schiusura delle uova.  
Piante forestali: contro Thaumetopoea pityocampa (Processionaria del pino), Lymantria dispar, Rhyacionia buoliana e Pristiphora abietina g. 50-70.

Su tutte le colture effettuare il trattamento in linea di massima durante la ovodeposizione o quando le uova stanno per schiudere.

Colture ornamentali e floricole in pieno campo: contro Operophtera brumata, Euproctis chryorrhoea g. 50-80. Trattare le colture durante la ovodeposizione o quando le uova stanno per schiudere.

Colture di funghi: contro Megaselia halterata (Phoridae) e Lycoriella auripila (Sciaridae).

- Miscelazione al substrato: 4 g di prodotto per mq di substrato. Preparare una soluzione che viene poi applicata come spray o con annaffiatore a getto fine al substrato, al momento della miscelazione. Incorporare completamente ed uniformemente.

- Bagnatura dopo l'incassettamento: 4 g. di prodotto in 2,5 litri di acqua per mq. Queste quantità sono basate su un normale peso del substrato di 3 tonnellate per 100 mq ed avranno una dose di 30 ppm di principio attivo.

#### PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

#### COMPATIBILITÀ

DIMILIN®25 P.B. non è miscibile con prodotti a reazione alcalina (polsolfuri, poltiglia bordolese).

**Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il preavviso di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

#### INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima della raccolta.

#### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI!**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O**

**CORSI D'ACQUA**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE**

**ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

®Marchio REGISTRATO

