

VOLDER

Erbicida sistemico di post-emergenza ad azione totale

Liquido Solubile

VOLDER

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:

Glifosate acido puro g 30,7 (=360g/l)

sottoforma di sale

isopropilamminico g 41,5 (=486 g/l)

Inerti e coadiuvanti q.b. a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

(H317) Può provocare una reazione allergica della pelle; (H319) Provoca grave irritazione oculare; (H411) Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

(P273) Non disperdere nell'ambiente; (P280) Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; (P302+P352) IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone; (P333+P313) In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico; (P305+P351+P338) IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; (P337+P313) Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico; (P101) In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto; (P391) Raccogliere la fuoriuscita; (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

AGROWIN BIOSCIENCES S.r.l.

Via Monte Grappa, 7 – Bergamo – Tel. +39 0331 440977

Officine di Produzione : TORRE S.r.l. – Via Pian d'Asso - Torrenieri (SI) – Tel. 0577 834129 / ALTHALLER ITALIA S.r.l.- San Colombano al Lambro (MI) – Tel. 0371 208032 / CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE) – Tel. 0532 848477 / Sinon Corporation Taiwan, ROC – Tel. +886-4-26938100 / Sinon Chemical (China) Co., Ltd. – Shanghai, China – Tel. +86-21-5749-373

Registrazione n. 13670 Ministero della Sanità del 05/10/2011

Contenuto netto: ml 10 - 20 - 50 - 100 - 250 - 500;
Litri 1 - 5 - 10 - 20-50

Partita n.:*



Attenzione



PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell'uso non agricolo su: suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%; aree vulnerabili e zone di rispetto, di cui all'art.93, comma 1 e all'art.94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Informazioni mediche:

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico e, se possibile, mostrargli l'etichetta

Epoca d'impiego : post-emergenza

Il prodotto deve essere impiegato in post-emergenza delle infestanti. Viene assorbito dalle parti aeree delle piante e traslocato in breve tempo a radici, rizomi, tuberi, stoloni e bulbi. Temperatura alta, elevata umidità e intensa luce solare favoriscono l'azione del prodotto. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente ne facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta.

Dosi e settori d'impiego :

Il prodotto si impiega alle dosi di 1,5 - 12 litri per ettaro in 300 - 400 litri di acqua sull'interfila delle seguenti colture : **Melo, Pero, Vite, Olivo, Noce, Agrumi (arancio, mandarino, clementini, limone, pompelmo, limette, pomeli, bergamotto, cedro, chinotto).**

Per le **olive da olio**, nella preparazione delle piazzole di raccolta, applicare il prodotto fino a 6 litri per ettaro almeno 7 giorni prima della raccolta.

Drupacee (pesco, nettarine, albicocco, ciliegio, susino): è possibile il manifestarsi di effetti fitotossici se la deriva dovesse colpire anche il tronco ben lignificato.

Barbabetola da zucchero, Pomodoro, Melanzana, Carciofo, Fagiolino, Pisello, Fava, Carota, Erba medica, Prati di leguminose e Graminacee, Mais (da non impiegare in pre-raccolta), Soia, Patata, Rosa, Mandorlo, Pioppo, Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali: effettuare trattamenti solo con attrezzature selettive (a spugna, a corda, ecc.).

Asparago: trattare in pre-emergenza della coltura.

Terreni agrari in assenza di coltura, prima o dopo la coltivazione di Fragola, Barbabetola da zucchero, Frumento, Orzo, Segale, Avena, Riso, Mais, Soia, Ortaggi, Prati, Vivai. Trattare con infestanti già emerse.

Aree non destinate alle colture agricole: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili (con l'esclusione di parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie), sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

Dosi di impiego:

- 3,5 l/ha contro la maggior parte delle infestanti presenti
- 4,5 - 5 l/ha contro *Sorghum halepense*, *Agropyron repens*, *Ranunculus spp.*
- 5,5 - 7 l/ha contro *Cyperus rotundus*, *Cirsium arvense*, *Artemisia vulgaris*, *Potentilla spp.*, *Plantago spp.*, *Taraxacum officinale*, *Rumex spp.* e Felci.
- 8 - 10 l/ha contro *Convolvulus arvense*, *Cynodon dactylon*, *Urtica spp.*, *Daucus carota*, *Sonchus arvensis*, *Tussilago farfara*, *Cannuccia*
- 10 - 12 l/ha contro *Convolvulus arvensis* all'inizio dello sviluppo.

In tutti gli impieghi effettuare una sola applicazione all'anno del prodotto.

Fitotossicità : il prodotto non deve arrivare a contatto con le foglie, tralci e rami erbacei, polloni, e colture erbacee vicine alla zona trattata. Per il trattamento usare pompe a bassa pressione ed attrezzature selettive o munite di ugelli con spruzzo concentrato o munito di schermi protettivi. Dopo l'irrorazione lavare accuratamente tutto il materiale impiegato prima di usarlo per altri interventi antiparassitari.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato