

SIATTOL®**Insetticida-aficida sistemico in emulsione concentrata**

SIATTOL® Reg. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 13185 del 31-07-2009

Composizione

Imidacloprid puro	g. 17,10 (=200 g/l)
Coformulanti q. b. a	g. 100

Cheminova Agro Italia S.r.l.

Via F.lli Bronzetti 32/28 - 24124 Bergamo

Tel 035 19904468

Distribuito da:

GOWAN ITALIA Srl

Via Morgagni, 68 – 48018 Faenza (RA) - Tel 0546/629911

Officine di produzione:

SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)**CHEMINOVA A/S**

Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Taglie: ml 5-10-50-100-200-250-500; L 1-2-3-5

Partita n°

**ATTENZIONE**

INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 Provoca grave irritazione oculare. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.

REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Attenzione: Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto utilizzare occhiali di protezione.

Il prodotto contiene una sostanza altamente tossica per le api. Prima dell'applicazione del prodotto sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura o prossime alla fioritura, possibilmente anche nelle immediate vicinanze della coltura. Trattare l'ultima fila di alberi solo verso l'interno.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale.

Pomacee (melo, pero) – trattamenti consentiti a partire dalla fase di post-fioritura: contro Afidi (*Dysaphis plantaginea*, *Dysaphis pyri*, *Aphis gossypii*, *Aphis pomi*, *Eriosoma lanigerum*), Cicaline (*Empoasca flavescens*), contro Microlepidotteri (*Leucoptera satella*, *Lithocolletis blancardella*, *Lyonetia clerckella*), Psilla del melo (*Psilla mali*), Tentredini (*Hoplocampa* spp.): 50 ml/hl.

Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al momento del massimo sfarfallamento.

Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco) - trattamenti consentiti a partire dalla fase di

post-fioritura: contro afidi (*Myzus persicae*, *Myzus cerasi*, *Brachycaudus schwartzi*, *Hyalopterus* spp.): 50 ml/hl.

Il prodotto è efficace anche sui microlepidotteri (*Phyllonorycter* spp.). Contro Tentredine (*Hoplocampa brevis*) (susino), Cimicetta del mandorlo (*Monosteira unicastata*), Metcalfa (*Metcalfa pruinosa*) e Cicaline (*Empoasca* spp.): 50 ml/hl.

Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone) - trattamenti consentiti a partire dalla fase di post-fioritura: contro Afidi (*Aphis gossypii*, *Aphis citricola*, *Myzus persicae*, *Toxoptera aurantii*): 50 ml/hl. Contro Aleurodidi (es. *Aleurothrix floccosus*, *Dialeurodes citri*, ecc) Minatrice serpentina delle foglie (*Phyllocnistis citrella*): 75 ml/hl.

Vite (in vivaio) - trattamenti consentiti a partire dalla fase di post-fioritura contro Cicaline (*Scaphoideus titanus*, *Empoasca vitis* (=flavescens)), Metcalfa (*Metcalfa pruinosa*) e Fillossera (*Viteus vitifoliae*): 50 ml/hl.

Orticole:

- **pomodoro, melanzana, peperone (in serra ed in pieno campo):** contro Afidi (*Aphis gossypii*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*, *Aulacorthum solani*): 50 ml/hl. Contro Aleurodidi (es. *Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*) e Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 75 ml/hl. Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1lt/ha di prodotto.

- **Zucchini, cetriolo, cocomero (in serra ed in pieno campo):** contro Afidi (*Aphis gossypii*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*, *Aulacorthum solani*): 50 ml/hl. Contro Aleurodidi (es. *Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*): 75 ml/hl. Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1lt/ha di prodotto. Sulle colture in pieno campo intervenire solo dal termine della fioritura.

- **Melone (in serra ed in pieno campo):** contro Afidi (*Aphis gossypii*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*, *Aulacorthum solani*): 50 ml/hl. Contro Aleurodidi (es. *Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*): 75 ml/hl. Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1lt/ha di prodotto.

- **lattughe e simili** (crescione o beccalunga, dolcetta, lattuga, scarola/indivia, rucola, foglie e steli di brassica, altri tra cui cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella): contro Afidi (*Nasonovia ribisnigri*, *Aphis gossypii*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Mizus persicae*): 50 ml/hl.

- **fagiolo e fagiolino (in serra ed in pieno campo):** contro Afidi (*Aphis acanti*, *Aphis craccivora*, *Aphis fabae*): 50 ml/hl. Sulle colture in pieno campo intervenire solo dal termine della fioritura.

- **patata:** contro Afidi (*Aphis gossypii*, *Aphis nasturtii*, *Aphis fabae*, *Aulacorthum solani*, *Myzus persicae*, *Macrosiphum euphorbiae*): 50 ml/hl. Contro Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 75 ml/hl.

- **carciofo:** contro Afidi (*Anuraphis helichrysi*, *Brachycaudus cardui*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*): 50 ml/hl.

- **fragola (in serra ed in pieno campo):** trattamento per irrigazione contro afidi (*Chaetosiphon fragaefolii*) e aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum*): distribuire 0,75 lt/ha. Sulle colture in pieno campo intervenire solo dal termine della fioritura.

- **erba medica:** contro afidi (*Aphis craccivora*, *Aphis fabae*, *Acyrtosiphon anobrychis* (=pisum)), 50 ml/hl. Trattare subito dopo lo sfalcio e non applicare su colture per la produzione di seme.

Tabacco: contro Afidi (*Myzus nicotianae*, *Myzus persicae*) e Altica (*Epithrix hirtipennis*): 50 ml/hl. Sul tabacco è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 lt/ha di prodotto.

Floreali ed ornamentali: contro Afidi (es. *Aphis gossypii*, *Macrosiphoniella chrysanthemi*, *Macrosiphum rosae*) e Metcalfa (*Metcalfa pruinosa*): 50 ml/hl. Contro Aleurodidi (es. *Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*): 75 ml/hl. Su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante. Sulle colture in pieno campo, che fioriscono nell'anno di trattamento, impiegare SIATTOL solo dal termine della fioritura.

MODALITÀ DI IMPIEGO - Effettuare al massimo un trattamento l'anno. Aggiungere il prodotto direttamente nella botte.

COMPATIBILITÀ - Il prodotto è miscibile con prodotti a base di olio minerale (Coccitox Fluido, Fruttoil, Primoil).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per carciofo, lattughe e simili, fagiolo, fagiolino, cetriolo (in serra) e zucchini (in serra); 7 giorni per pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, cetriolo (in campo) e zucchini (in campo); 14 giorni per agrumi, patata e tabacco, mandorlo, vite, cavolfiore, broccolo ed erba medica; 21 giorni per pesco, nettarine, susino, ciliegio; 28 giorni per melo; 30 giorni per fragola; 35 giorni per albicocco; 50 giorni per pero.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

© Marchio registrato GOWAN ITALIA

SIATTOL®

Insetticida-aficida sistemico in emulsione concentrata

SIATTOL® Reg. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 13185 del 31-07-2009

Composizione

Imidacloprid puro	g. 17,10 (=200 g/l)
Coformulanti q. b. a	g. 100



Cheminova Agro Italia S.r.l.
Via F.lli Bronzetti 32/28 - 24124 Bergamo

Tel 035 19904468

Distribuito da:

GOWAN ITALIA Srl

Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA) - Tel 0546/629911

Officine di produzione:

SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)

CHEMINOVA A/S

Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)

ATTENZIONE

Taglie: ml 5-10-50-100

Partita n°

INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 Provoca grave irritazione oculare. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.

REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE
DISPERSO NELL'AMBIENTE**

© Marchio registrato GOWAN ITALIA