

# RIDOMIL GOLD COMBI WP

Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

Fungicida specifico per la protezione della vite dalla peronospora

Composizione  
100 g di prodotto contengono

**Metalaxil-m puro** g 4,85  
**Folpet puro** g 40  
**Coformulanti q.b. a** g 100

Registrazione Ministero della Sanità  
n. 10106 del 27/07/1999

Partita n. ....

contiene folpet. Può provocare una reazione allergica  
contiene: acido solforico monododecil estere di sale sodico

## INDICAZIONI DI PERICOLO

Provoca grave irritazione oculare. Nocivo se inalato. Sospettato di provocare il cancro. Molto tossico per gli organismi acquatici. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

## CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

## TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15 - ALBANO S. ALESSANDRO (BG) - Tel. 0363 355611

OFFICINA DI PRODUZIONE: DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

## DISTRIBUITO DA:

SYNGENTA ITALIA S.p.A. - Via Gallarate, 139 - 20151 Milano - Tel.02 334441

CONTENUTO Kg 1 (5 s.i. x 200 g)- Kg 1 (2 s.i. x 500 g)- Kg 2 (10 s.i. x 200 g)- Kg 5 (10 s.i. x 500 g)

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 15 metri.

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL-M 4,85% e FOLPET 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

**METALAXIL-M:** irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.

**FOLPET:** irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipertensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia: sintomatica.


Consultare un Centro Antiveleni.

## CARATTERISTICHE

RIDOMIL GOLD COMBI WP è un fungicida ad azione preventiva e curativa indicato per la protezione della vite dalla Peronospora. È costituito da una miscela di Metalaxil-M, fungicida sistemico appartenente alle fenilammidi, e Folpet, fungicida proteggente con meccanismo d'azione specifico.

## DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il primo trattamento verrà eseguito dopo il verificarsi della prima pioggia infettante: per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permetterà di mantenere delle cadenze fisse sganciate dalle piogge; infatti, anche piogge abbondanti e ripetute non diminuiscono l'efficacia del trattamento, né richiedono la necessità di ridurre l'intervallo tra le applicazioni. La traslocazione acropeta dello RIDOMIL GOLD COMBI WP consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento e l'altro.



ATTENZIONE

		(g/ha)	(kg/ha)	
VITE	Peronospora della vite (Plasmoparaviticola)	200	2	Iniziare i trattamenti quando si verificano condizioni ambientali idonee a promuovere l'infezione primaria. Proseguire ad intervalli di 7-14 giorni per un massimo di 3 trattamenti.

Adottare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura delle colture trattate, evitando lo sgocciamento della vegetazione:

Vite: volume di riferimento per le dosi ad ettaro: 1000 litri; per volumi d'irrorazione inferiori, fare comunque riferimento alle dosi indicate per ettaro.

Non superare l'intervallo di 7-10 giorni fra l'ultimo trattamento con RIDOMIL GOLD COMBI WP ed il successivo con prodotti a diverso meccanismo d'azione.

L'uso regolare dello RIDOMIL GOLD COMBI WP per i trattamenti alla vite consente di prevenire e contenere in misura apprezzabile le infezioni di *Botrytis cinerea*.

Qualora si verificasse una mancata efficacia del trattamento a causa della selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con fungicidi con diverso meccanismo d'azione. Non applicare su vivai di vite.

**COMPATIBILITÀ** - Non miscibile con la Poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con olii minerali e polisolfuri.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ** - Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

“Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli uccelli e tossica per le api.”

**Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto**

## ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

## MODO DI UTILIZZO

Riempire l'atomizzatore con il 20-25% di acqua.	Estrarre i sacchetti idrosolubili dalla confezione con le mani asciutte	Introdurre nel serbatoio il numero di sacchetti come da etichetta.	Mettere in funzione l'agitatore e attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti).	Aggiungere la restante parte di acqua necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

**AVVERTENZE PARTICOLARI** - Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti solubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti con le mani bagnate.

**STOCCAGGIO** - Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

**ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI** - Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa sì che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

Coltura	Malattia	Dosi	Dosi	Modalità di applicazione
---------	----------	------	------	--------------------------

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 02/11/2017 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 12 febbraio 2018

# RIDOMIL GOLD COMBI WP

Polvere bagnabile

Fungicida specifico per la protezione della vite dalla peronospora

Composizione		
100 g di prodotto contengono		
Metalaxil-m puro	g 4,85	Registrazione Ministero della Sanità
Folpet puro	g 40	n. 10106 del 27/07/1999
Coformulanti q.b. a	g 100	
contiene folpet. Può provocare una reazione allergica		
contiene: acido solforico monododecil estere di sale sodico		
<b>INDICAZIONI DI PERICOLO</b>		
Provoca grave irritazione oculare. Nocivo se inalato. Sospettato di provocare il cancro. Molto tossico per gli organismi acquatici. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.		
<b>CONSIGLI DI PRUDENZA</b>		
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.		
<b>TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE</b>		
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15 - ALBANO S. ALESSANDRO (BG) - Tel. 0363 355611		
<b>OFFICINA DI PRODUZIONE:</b> DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)		
<b>DISTRIBUITO DA:</b>		
SYNGENTA ITALIA SpA - Via Gallarate, 139 - 20151 Milano - Tel.02 334441		
CONTENUTO 1 Kg - 2 Kg - 5 Kg - 10 Kg		Partita n.
.....		



**ATTENZIONE**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 15 metri.

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: METALAXIL-M 4,85% e FOLPET 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

**METALAXIL-M:** irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.

**FOLPET:** irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni.

## CARATTERISTICHE

RIDOMIL GOLD COMBI WP è un fungicida ad azione preventiva e curativa indicato per la protezione della vite dalla Peronospora. È costituito da una miscela di Metalaxil-M, fungicida sistemico appartenente alle fenilammidi, e Folpet, fungicida protettivo con meccanismo d'azione aspecifico.

## DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il primo trattamento verrà eseguito dopo il verificarsi della prima pioggia infettante: per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permetterà di mantenere delle cadenze fisse sganciate dalle piogge; infatti, anche piogge abbondanti e ripetute non diminuiscono l'efficacia del trattamento, né richiedono la necessità di ridurre l'intervallo tra le applicazioni. La traslocazione acropeta dello RIDOMIL GOLD COMBI WP consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento e l'altro.

Coltura	Malattia	Dosi (g/ha)	Dosi (kg/ha)	Modalità di applicazione
VITE da vino	Peronospora della vite ( <i>Plasmopara viticola</i> )	200	2	Iniziare i trattamenti quando si verificano condizioni ambientali idonee a promuovere l'infezione primaria. Proseguire ad intervalli di 7-14 giorni per un massimo di 3 trattamenti.

Adottare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura delle colture trattate, evitando lo sgocciolamento della vegetazione:

Vite: volume di riferimento per le dosi ad ettaro: 1000 litri; per volumi d'irrorazione inferiori, fare comunque riferimento alle dosi indicate per ettaro.

Non superare l'intervallo di 7-10 giorni fra l'ultimo trattamento con RIDOMIL GOLD COMBI WP ed il successivo con prodotti a diverso meccanismo d'azione.

L'uso regolare dello RIDOMIL GOLD COMBI WP per i trattamenti alla vite consente di prevenire e contenere in misura apprezzabile le infezioni di *Botrytis cinerea*.

Qualora si verificasse una mancata efficacia del trattamento a causa della selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con fungicidi con diverso meccanismo d'azione. Non applicare su vivai di vite.

## Compatibilità

Non miscibile con la Poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con olii minerali e polisolfuri.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

## Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

“Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli uccelli e tossica per le api.”

## Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

## ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

ETICHETTA SACCHETTO IDROSOLUBILE

<b>RIDOMIL GOLD COMBI WP</b>	
<b>Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili</b>	
<b>Fungicida specifico per la protezione della vite dalla peronospora</b>	
<b>Composizione</b>	
100 g di prodotto contengono:	
<b>Metalaxil-m puro</b> g 4,85	
<b>Folpet puro</b> g 40	
<b>Coformulanti q.b. a</b> g 100	
<i>contiene folpet. Può provocare una reazione allergica</i>	
<i>contiene: acido solforico monododecil estere di sale sodico</i>	
<b>TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE</b>	
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15 - ALBANO S. ALESSANDRO (BG) - Tel. 0363 355611	
<b>OFFICINA DI PRODUZIONE:</b> DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)	
<b>DISTRIBUITO DA:</b> SYNGENTA ITALIA S.p.A. - Via Gallarate, 139 - 20151 Milano - Tel.02 334441	
<b>Registrazione Ministero della Sanità n. 10106 del 27/07/1999</b>	
<b>g 200-500</b>	

**Avvertenza: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione**

**Da sciogliere in acqua senza rompere.**

**Da non vendere né conservare fuori dalla confezione.**