

GAUCHO® 70 WS

INSETTICIDA SISTEMICO

per la concia industriale delle sementi della barbabietola da zucchero (confettatura)

POLVERE BAGNABILE PER CONCIA

COMPOSIZIONE

100 g di GAUCHO® 70 WS contengono:
70 g di Imidacloprid puro
coformulanti quanto basta a 100

Indicazioni di pericolo

H302 Nocivo se ingerito.

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Consigli di prudenza

P280 Usare guanti/indumenti protettivi.

P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.



ATTENZIONE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG);

STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)

Officina di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)

Officina di confezionamento: Bayer S.A.S. – Marle-sur-Serre (Francia)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8905 del 25/07/96

Contenuto netto: kg 1-3-5-10-20-25

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Il prodotto contiene una sostanza attiva altamente tossica per le api.

Durante la semina impiegare attrezzature adeguate atte a garantire una corretta incorporazione nel terreno.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Il prodotto è esclusivamente destinato ad uso industriale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleeni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Barbabietola da zucchero: 65-130 g per unità di seme contro elateridi (*Agriotes spp.*), altica (*Chaetocnema tibialis*), atomaria (*Atomaria linearis*), blianiuli (*Blianiulus spp.*), tipula (*Tipula spp.*), mosca della bietola (*Pegomya hyoscyami*). Utilizzare la dose più alta quando si voglia garantire anche il controllo di afidi (es. *Aphis fabae*, *Myzus persicae*).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dall'umidità.



® Marchio registrato Gruppo Bayer

www.cropscience.bayer.it

AF 16.11.16