

MEDIATOR® Extra SL

INSETTICIDA – AFICIDA SISTEMICO PER SOLO USO IN SERRA
PERMANENTE CONCENTRATO SOLUBILE

COMPOSIZIONE

100 GRAMMI DI PRODOTTO

CONTENGONO:

Imidacloprid puro...g 17,8 (200 g/l)

coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H319 – Provoca grave irritazione oculare.

H361d – Sospettato di nuocere al feto.

H410 – Molto tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso.

P273 – Non disperdere nell'ambiente. P281

– Utilizzare il dispositivo di protezione

individuale richiesto. P308 + P313 – In

caso di esposizione o di possibile

esposizione, consultare un medico. P305 +

P351 + P338 – In caso di contatto con gli

occhi: sciacquare accuratamente per

parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a

contatto se è agevole farlo. Continuare a

sciacquare. P391 – Raccogliere il materiale

fuoriuscito. P405 – Conservare sotto

chiave. P501 – Smaltire il prodotto /

recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente,

seguire le istruzioni per l'uso.



Nufarm Italia S.r.l.

Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 MILANO (MI)

Sede operativa Via Guelфа 5 – Bologna Tel. 051 0394022

Officine di produzione:

Nufarm SAS – Gaillon (France)

Safapac limited – Peterborough (UK)

Torre Srl – Torrenieri (SI)

Althaller Italia S.r.l. – San Colombano (MI)

Registrazione del Ministero della Salute n. 13858 del 25/01/2011

Contenuto netto:

ml 5, 10, 50, 100, 200, 250, 500; litri 1, 2, 3

Partita n°.....



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non rientrare nelle zone trattate prima che la coltura risulti completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata pre-fioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

MEDIATOR Extra SL è un insetticida-aficida sistemico a base di imidacloprid, ad attività translaminare e con attività per contatto ed ingestione; agisce sul sistema nervoso dei parassiti da controllare.

ISTRUZIONI PER L'USO

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in serre permanenti. Le piante floreali ed ornamentali trattate, in tutta la fase di coltivazione, non possono essere poste né trapiantate all'esterno durante il ciclo produttivo.

Orticole:

- **Pomodoro, melanzana:** contro afidi (*Aphis gossypii*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*, *Aulacorthum solani*): 0,05% (50 ml/100 l). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto.

- **Zucchini, cetriolo, peperone, cocomero, melone, zucca, cetriolino ed altre cucurbitacee:** contro afidi (*Aphis gossypii*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*, *Aulacorthum solani*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*) 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Con applicazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto.

- **Fagiolo e fagiolino:** contro afidi (*Aphis acanthi*, *Aphis craccivora*, *Aphis fabae*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua), distribuire 0,4-0,5 l/ha di prodotto. In pieno campo irrorare solo in post-fioritura ed esclusivamente le varietà determinate e con unica fioritura ben definita.

- **Fragola:** trattamento per irrigazione contro afidi (*Chaetosiphon fragaefolii*) e aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum*): distribuire 0,75 l/ha. **Le colture trattate in serra non possono essere poste all'esterno fino alla conclusione del raccolto.**

- **Floreali ed ornamentali:** contro afidi (es. *Aphis gossypii*, *Macrosiphonia chrysanthemii*, *Macrosiphum rasae*) e *Metcalfa pruinosa*: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*) 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Con appli-

cazioni fogliari si devono distribuire 0,5-0,75 l/ha di prodotto, su floreali ed ornamentali è possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante. **Le piante floreali ed ornamentali trattate in serra non possono essere poste all'esterno fino a conclusione della fioritura.**

MODALITA' DI IMPIEGO: effettuare al massimo un trattamento l'anno.

Aggiungere il MEDIATOR Extra SL direttamente nella botte.

NOCIVITA': Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni fagiolo, fagiolino, cetriolo e zucchini; 7 giorni per pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone; 30 giorni per fragola prima del raccolto.

Avvertenze agronomiche:

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m dai corpi idrici superficiali.

ATTENZIONE – DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO

ATTENZIONE: Usare occhiali di protezione durante la fase di miscelazione/carico del prodotto

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Conservare al riparo dal gelo

MEDIATOR[®] Extra SL

INSETTICIDA – AFICIDA SISTEMICO PER SOLO USO IN SERRA PERMANENTE
CONCENTRATO SOLUBILE



ATTENZIONE

COMPOSIZIONE

100 GRAMMI DI PRODOTTO CONTENGONO:

Imidacloprid puro g 17,8 (200 g/l)

coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H319 – Provoca grave irritazione oculare. H361d – Sospettato di nuocere al feto. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P281 – Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P308 + P313 – In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P305 + P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 – Conservare sotto chiave. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



Nufarm Italia S.r.l.

Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 Milano (MI)

Sede operativa Via Guelfa 5 – Bologna (BO), Tel. 051 0394022

Officine di produzione:

Nufarm SAS – Gaillon (Francia)

Safapac Limited – Peterborough (UK)

Torre Srl – Torrenieri (SI)

Althaller Italia S.r.l. – San Colombano (MI)

Registrazione del Ministero della Salute n° 13858 del 25/01/2011

Contenuto netto:

ml 5, 10, 50, 100

Partita n°

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE