

# ELECTIS® TRIO WDG

Fungicida sistemico e di contatto con azione preventiva e curativa per il controllo della peronospora della vite  
**Granuli idrodispersibili**

## ELECTIS TRIO WDG

Composizione:

- FOSETIL ALLUMINIO puro g 35
- CYMOXANIL puro g 2.8
- ZOAXAMIDE pura g 3.6
- Acido metilnaftalenesolfonico/formaldeide, copolimero, sale di sodio
- Coformulanti q.b. a g 100

### INDICAZIONI DI PERICOLO

Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

### CONSIGLI DI PRUDENZA

Evitare di respirare la polvere/la nebbia/gli aerosol. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Raccogliere la fuoriuscita. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.



**PERICOLO**

**GOWAN ITALIA S.r.l.**

Via Morgagni, 68 – 48018 Faenza (RA)  
Tel. 0546/629911



Autorizzazione Ministero della Salute n.  
16104 del 19.05.2015

**Officina di produzione:**

S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA- Cotignola (RA)

**Taglie:** g 200-400-500; kg 1-2-2.5-4-5-10-15-20-25

**Partita n.:** vedere sigla sovrainpressa

d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Indossare guanti, abbigliamento/tuta da lavoro e protezione oculare durante la fase di miscelazione e carico del prodotto. Indossare abbigliamento/tuta da lavoro e stivali impermeabili durante l'applicazione. Dopo l'applicazione evitare di rientrare nell'area trattata fino a che la coltura non risulti completamente asciutta. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: **FOSETIL ALLUMINIO 35%, CIMOXANIL 2.8%, ZOAXAMIDE 3.6%**, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **FOSETIL ALLUMINIO:** sintomi: sedazione, dispnea, depressione.

**CIMOXANIL:** Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

**ZOAXAMIDE:** sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione. Terapia: sintomatica. Controindicazioni: ==

**Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.**

### AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto nell'imballo originale, in un luogo fresco e asciutto. A temperatura ambiente il prodotto ha una stabilità garantita di almeno 1 anno.

### MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO

Electis® Trio WDG è un fungicida antiperonosporico a tre vie a base di Zoxamide, Fosetyl-Alluminio e Cymoxanil, per la difesa della vite. Le tre sostanze attive, dotate di differenti meccanismi d'azione e mobilità diverse e complementari, agiscono su tutte le fasi del ciclo biologico del fungo. Inoltre, l'elevata attività preventiva della Zoxamide (si lega fortemente alle cere cuticolari che ricoprono tutti gli organi della pianta - germogli, foglie, grappoli - consentendo una duratura resistenza al dilavamento) e l'azione sistemica ed endoterapica del Fosetyl Al e del Cymoxanil garantiscono i massimi livelli di efficacia anche in caso di piogge dilavanti.

**Vite da tavola e da vino:** contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*) impiegare preventivamente alla dose di 400-500 g/hL (kg 4-5 per ha) iniziando gli interventi dallo stadio di differenziazione dei grappolini, proseguendo ad intervalli di 10-12 giorni, sino alla fase accrescimento acini; utilizzare l'intervallo più breve e la dose maggiore nel caso di condizioni favorevoli allo sviluppo del patogeno (andamento stagionale umido e/o piovoso).

La dose di impiego è calcolata per irroratrici a volume normale e quantitativi di soluzione di 1000 L/ha. Nel caso di irroratrici a basso e ultrabasso volume aumentare proporzionalmente la concentrazione del prodotto in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.

**Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti zoxamide più di 5 volte nell'arco della stagione e comunque non più di 3 volte consecutive, alternando l'uso del prodotto con quello di fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.**

**Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.**

**COMPATIBILITÀ:** Il prodotto non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina, con formulati contenenti rame e con i formulati oleosi. Eventuali miscele con alcuni concimi fogliari contenenti azoto e alcuni fitoregolatori potrebbero originare fenomeni di incompatibilità e quindi è opportuno effettuare preventivamente saggi preliminari di compatibilità fisico-chimica, soprattutto nel caso in cui si utilizzino irroratrici a ultra basso volume (ULV).

**FITOTOSSICITÀ:** Electis® Trio WDG nelle normali condizioni di impiego risulta selettivo per le colture indicate in etichetta. Nelle miscele estemporanee con altri formulati e in caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi preliminari di selettività su piccole superfici prima di estendere l'intervento all'intero appezzamento, soprattutto nel caso in cui si utilizzino irroratrici a ultra basso volume (ULV).

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.**

### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; non applicare con i mezzi aerei; operare in assenza di vento; da non vendersi sfuso; smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato.

**NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H):  
CHEMTREC +1.703.527.3887**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale

**ELECTIS® Marchio registrato di Gowan Crop Protection Limited**

**ZOAXAMIDE sostanza attiva originale in esclusiva a Gowan Crop Protection Limited**

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16 Novembre 2016 e modificata ai sensi dell'art.7, comma 1, D.P.R. 55/2012 con validità dal 03.10.2017

# ELECTIS® TRIO WDG PF<sub>n</sub>PE

Fungicida sistemico e di contatto con azione preventiva e curativa per il controllo della peronospora della vite  
**Granuli idrodispersibili**

## ELECTIS TRIO WDG PF<sub>n</sub>PE

Composizione:

- FOSETIL ALLUMINIO puro g 35
- CYMOXANIL puro g 2.8
- ZOAXAMIDE pura g 3.6
- Acido metilnaftalenesolfonico/formaldeide, copolimero, sale di sodio
- Coformulanti q.b. a g 100

### INDICAZIONI DI PERICOLO

Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

### CONSIGLI DI PRUDENZA

Evitare di respirare la polvere/la nebbia/gli aerosol. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Raccogliere la fuoriuscita. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.



**PERICOLO**

**GOWAN ITALIA S.r.l.**

Via Morgagni, 68 – 48018 Faenza (RA)

Tel. 0546/629911



**Autorizzazione Ministero della Salute n. 16104 del 19.05.2015**

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/05/2020

### Officina di produzione:

S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Cotignola (RA)

Taglie: g 200-400-500

Partita n.: vedere sigla sovraimpresa

d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Indossare guanti, abbigliamento/tuta da lavoro e protezione oculare durante la fase di miscelazione e carico del prodotto. Indossare abbigliamento/tuta da lavoro e stivali impermeabili durante l'applicazione. Dopo l'applicazione evitare di rientrare nell'area trattata fino a che la coltura non risulti completamente asciutta. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO 35%, CIMOXANIL 2.8%, ZOAXAMIDE 3.6%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: FOSETIL ALLUMINIO: sintomi: sedazione, dispnea, depressione.

CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

ZOAXAMIDE: sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione. Terapia: sintomatica. Controindicazioni: ==

**Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.**

### AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto nell'imballo originale, in un luogo fresco e asciutto. A temperatura ambiente il prodotto ha una stabilità garantita di almeno 1 anno.

### MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO

Electis® Trio WDG PF<sub>n</sub>PE è un fungicida antiperonosporico a tre vie a base di Zoxamide, Fosetyl-Alluminio e Cymoxanil, per la difesa della vite. Le tre sostanze attive, dotate di differenti meccanismi d'azione e mobilità diverse e complementari, agiscono su tutte le fasi del ciclo biologico del fungo. Inoltre, l'elevata attività preventiva della Zoxamide (si lega fortemente alle cere cuticolari che ricoprono tutti gli organi della pianta - germogli, foglie, grappoli - consentendo una duratura resistenza al dilavamento) e l'azione sistemica ed endoterapica del Fosetyl Al e del Cymoxanil garantiscono i massimi livelli di efficacia anche in caso di piogge dilavanti.

**Vite da tavola e da vino:** contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*) impiegare preventivamente alla dose di 400-500 g/hL (kg 4-5 per ha) iniziando gli interventi dallo stadio di differenziazione dei grappolini, proseguendo ad intervalli di 10-12 giorni, sino alla fase accrescimento acini; utilizzare l'intervallo più breve e la dose maggiore nel caso di condizioni favorevoli allo sviluppo del patogeno (andamento stagionale umido e/o piovoso).

La dose di impiego è calcolata per irroratrici a volume normale e quantitativi di soluzione di 1000 L/ha. Nel caso di irroratrici a basso

e ultrabasso volume aumentare proporzionalmente la concentrazione del prodotto in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.

**Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti zoxamide più di 5 volte nell'arco della stagione e comunque non più di 3 volte consecutive, alternando l'uso del prodotto con quello di fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.**

**Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.**

**COMPATIBILITÀ:** Il prodotto non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina, con formulati contenenti rame e con i formulati oleosi. Eventuali miscele con alcuni concimi fogliari contenenti azoto e alcuni fitoregolatori potrebbero originare fenomeni di incompatibilità e quindi è opportuno effettuare preventivamente saggi preliminari di compatibilità fisico-chimica, soprattutto nel caso in cui si utilizzino irroratrici a ultra basso volume (ULV).

**FITOTOSSICITÀ:** Electis® Trio WDG PF<sub>n</sub>PE nelle normali condizioni di impiego risulta selettivo per le colture indicate in etichetta. Nelle miscele estemporanee con altri formulati e in caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi preliminari di selettività su piccole superfici prima di estendere l'intervento all'intero appezzamento, soprattutto nel caso in cui si utilizzino irroratrici a ultra basso volume (ULV).

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.**

### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; non applicare con i mezzi aerei; operare in assenza di vento; da non vendersi sfuso; smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato.

**NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H):  
CHEMTREC +1.703.527.3887**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale

**ELECTIS® Marchio registrato di Gowan Crop Protection Limited  
ZOAXAMIDE sostanza attiva originale in esclusiva a Gowan Crop Protection Limited**

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16 Novembre 2016 e modificata ai sensi dell'art.7, comma 1, D.P.R. 55/2012 con validità dal 03.10.2017 e ai sensi del DM n.33 del 22.01.18 con validità dal 7 gennaio 2019