

# ARPEL TRIPLO BLU

Fungicida sistemico e di contatto, ad azione preventiva e curativa, per la lotta contro la Peronospora della vite, del pomodoro e del tabacco in polvere bagnabile

## ARPEL TRIPLO BLU

### Composizione

100 grammi di prodotto contengono  
- Fosetil-Alluminio puro g 32,5  
- Cimoxanil puro g 2,5  
- Mancozeb puro g 25  
- Coformulanti q. b. a g 100

### Indicazioni di pericolo

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 - Provoca gravi lesioni oculari. H361d - Sospettato di nuocere al feto. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. - EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

### Consigli di prudenza

P261 Evitare di respirare la polvere. - P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. - P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

## PERICOLO



### Titolare della Registrazione

SCAM S.p.A.

Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena - Tel. 059-586511

### Officine di produzione

SCAM S.p.A. - MODENA - DIACHEM S.p.A. - Unità Produttiva SIFA - CARAVAGGIO - Via Mozzanica, 9-11 24043 Caravaggio (BG)

### Distribuito da

DIACHEM S.p.A. - Unità Produttiva SIFA - CARAVAGGIO - Via Mozzanica, 9-11 24043 Caravaggio (BG) - Tel. 0363 355611

Registrazione del Ministero della Sanità n. 5154 del 22/12/1982

Contenuto netto: kg 0,4 - 1 - 5 - 10

Confezioni idrosolubili: kg 2 (5 s.i. da g 400) - kg 4 (10 s.i. da g 400) - kg 8 (4 s.i. da kg 2)

Partita n. ....

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO** Trattasi d'associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO puro 32,5%; CIMOXANIL puro 2,5%, MANCOZEB puro 25% le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: FOSETIL ALLUMINIO - **Sintomi:** == CIMOXANIL - Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. MANCOZEB - **Sintomi:** cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. **Terapia:** sintomatica. **Controindicazioni:** ===

### CARATTERISTICHE

ARPEL TRIPLO BLU è un fungicida antiperonosporico che unisce le proprietà sistemiche del Fosetil-Alluminio, le caratteristiche di citotropicità del Cimoxanil e l'azione di contatto del Mancozeb. ARPEL TRIPLO BLU possiede attività preventiva e curativa, essendo in grado di inibire lo sviluppo del patogeno entro 2 giorni dal momento dell'infezione. ARPEL TRIPLO BLU è caratterizzato da una lunga persistenza d'azione che consente interventi a cadenza fissa assicurando la protezione sia la vegetazione presente al momento del trattamento che quella formatasi successivamente.

### DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Colture	Parassiti	Dosi	Applicazione
VITE	Peronospora	400 g/hl (4 Kg/Ha)	Iniziare i trattamenti quando si verificano le prime condizioni favorevoli allo sviluppo della peronospora; proseguire quindi le applicazioni a cadenza di 12 giorni. Nei casi di andamento stagionale particolarmente piovoso ed in presenza di elevata pressione della malattia accorciare l'intervallo a 10 giorni.
POMODORO	Peronospora	400 g/hl	Trattamenti preventivi ogni 10-12 giorni
TABACCO	Peronospora	4 Kg/Ha	Interventi preventivi ogni 10-12 giorni

Nella preparazione della miscela diluire la quantità di prodotto occorrente in poca acqua e mescolare fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Versare quindi nel serbatoio dell'irroratrice e portare a volume di distribuzione mantenendo in funzione l'agitatore.

**COMPATIBILITÀ:** il prodotto non è compatibile con gli olii minerali. In caso di miscela con concimi fogliari si consiglia di procedere a saggi preliminari.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta delle uve, 30 giorni prima della raccolta del tabacco e 20 giorni prima della raccolta dei pomodori.

### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

# ARPEL TRIPLO BLU

Fungicida sistemico e di contatto, ad azione preventiva e curativa, per la lotta contro la Peronospora della vite, del pomodoro e del tabacco in polvere bagnabile

<b>ARPEL TRIPLO BLU</b> <b>Composizione</b> 100 grammi di prodotto contengono - Fosetil-Alluminio puro g 32,5 - Cimoxanil puro g 2,5 - Mancozeb puro g 25 - Coformulanti q. b. a g 100  <b>Indicazioni di pericolo</b> H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 - Provoca gravi lesioni oculari. H361d - Sospettato di nuocere al feto. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. - EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  <b>Consigli di prudenza</b> P261 Evitare di respirare la polvere. - P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. - P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.  <b>Titolare della Registrazione</b> <b>SCAM S.p.A.</b> Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena - Tel. 059-586511  <b>Officine di produzione</b> <b>SCAM S.p.A. - MODENA - DIACHEM S.p.A. - Unità Produttiva SIFA - CARAVAGGIO - Via Mozzanica, 9-11 24043 Caravaggio (BG)</b> <b>Distribuito da</b> <b>DIACHEM S.p.A. - Unità Produttiva SIFA - CARAVAGGIO - Via Mozzanica, 9-11 24043 Caravaggio (BG) - Tel. 0363 355611</b> <b>Registrazione del Ministero della Sanità n. 5154 del 22/12/1982</b>  Contenuto netto: kg 2 (5 s.i. da g 400) - kg 4 (10 s.i. da g 400) - kg 8 (4 s.i. da kg 2)  Partita n. ....	<b>PERICOLO</b> 
---	---------------------

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade].

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO** Trattasi d'associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO puro 32,5%; CIMOXANIL puro 2,5%, MANCOZEB puro 25% le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: FOSETIL ALLUMINIO - **Sintomi:** == CIMOXANIL - Derivato dell'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. MANCOZEB - **Sintomi:** cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporefflessia. **Terapia:** sintomatica. **Controindicazioni:** === **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

## CARATTERISTICHE

ARPEL TRIPLO BLU è un fungicida antiperonosporico che unisce le proprietà sistemiche del Fosetil-Alluminio, le caratteristiche di citotropicità del Cimoxanil e l'azione di contatto del Mancozeb. ARPEL TRIPLO BLU possiede attività preventiva e curativa, essendo in grado di inibire lo sviluppo del patogeno entro 2 giorni dal momento dell'infezione. ARPEL TRIPLO BLU è caratterizzato da una lunga persistenza d'azione che consente interventi a cadenza fissa assicurando la protezione sia la vegetazione presente al momento del trattamento che quella formatasi successivamente.

## DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Colture	Parassiti	Dosi	Applicazione
VITE	Peronospora	400 g/hl (4 Kg/Ha)	Iniziare i trattamenti quando si verificano le prime condizioni favorevoli allo sviluppo della peronospora; proseguire quindi le applicazioni a cadenza di 12 giorni. Nei casi di andamento stagionale particolarmente piovoso ed in presenza di elevata pressione della malattia accorciare l'intervallo a 10 giorni.
POMODORO	Peronospora	400 g/hl	Trattamenti preventivi ogni 10-12 giorni
TABACCO	Peronospora	4 Kg/Ha	Interventi preventivi ogni 10-12 giorni


Nella preparazione della miscela diluire la quantità di prodotto occorrente in poca acqua e mescolare fino ad ottenere una poltiglia omogenea. Versare quindi nel serbatoio dell'irroratrice e portare a volume di distribuzione mantenendo in funzione l'agitatore.

**COMPATIBILITÀ:** il prodotto non è compatibile con gli olii minerali. In caso di miscela con concimi fogliari si consiglia di procedere a saggi preliminari.  
**AVVERTENZA D'USO:** nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all'introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione chiudere bene la scatola. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.


**INTERVALLO DI SICUREZZA:** sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta delle uve, 30 giorni prima della raccolta del tabacco e 20 giorni prima della raccolta dei pomodori.

## ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Da non vendere né conservare fuori dalla confezione - Da sciogliere in acqua senza rompere



1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua




2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti



3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore



4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed...



5) ... aggiungere la restante parte d'acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

**STAMPIGLIATURA DA APPORRE SUI SACCHETTI IDROSOLUBILI**

# ARPEL TRIPLO BLU

**Fungicida sistemico e di contatto, ad azione preventiva e curativa, per la lotta contro la Peronospora della vite, del pomodoro e del tabacco in polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili**

## COMPOSIZIONE

**100 g di prodotto contengono:**

- Fosetil alluminio puro g 32,5
- Cimoxanil puro g 2,5
- Mancozeb puro g 25
- Coformulanti q.b. a g 100

## PERICOLO



Da sciogliere in acqua senza rompere

**Contenuto netto: 400 g – 2 Kg**

**Avvertenza:** leggere l'etichetta riportata sulla confezione prima di utilizzare il prodotto

**DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE**

**Titolare della Registrazione**

**SCAM S.p.A.**

Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena - Tel. 059-586511

**Registrazione del Ministero della Sanità n. 5154 del 22/12/1982**