

PERSHING

GRANULARE

INSETTICIDA PER LA LOTTA CONTRO GLI INSETTI DEL TERRENO DA
APPLICARE PRIMA DELLA SEMINA

Meccanismo d'azione IRAC: 1B

PERSHING Registrazione del Ministero della Salute n° 12320 del 23/11/2004

Composizione:

CLORPIRIFOS puro	g.	5
Coformulanti q.b. a	g.	100

Partita n.

Contenuto:
0,375-0,5-1-5-10 kg

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via F.lli Bronzetti 32/28 - 24124 Bergamo – Tel. 035/19904468

Distribuito da:

BAYER CROPSCIENCE Srl, Viale Certosa 130, 20156 (MI) – Tel 02-3972 1

SIVAM S.P.A. Via XXV Aprile, 4, 26841 Casalpusterlengo (LO) - Tel. +39 0377 8341

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):

Isagro S.p.A. – Via Nettunense Km. 23,400 – Aprilia (LT)

Bayer CropScience Srl - via delle Industrie, 9 - Filago (BG)

Sipcam S.p.A. - Via Vittorio Veneto 81 - 26857 Salerano sul Lambro (LO)

Stabilimenti di confezionamento:

Sinapak Srl - Via dell'Industria e dell'Artigianato 7, 27049 Stradella (PV)



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene anidride maleica. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali. Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo al solco. Durante le fasi di carico e applicazione, utilizzare guanti protettivi e abiti da lavoro. Durante la pulizia e la manutenzione delle apparecchiature utilizzare le stesse misure di protezione utilizzate durante l'applicazione. Durante l'applicazione con trattore dotato di cabina chiusa e dispositivo di filtraggio dell'aria, si può evitare di utilizzare i dispositivi di protezione personale a condizione che si mantengano chiusi i finestrini della cabina. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici (di prima comparsa):** nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. **Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa):** astenia e paralisi muscolari. **Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali:** confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte:** generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il PERSHING è un insetticida granulare per la lotta contro gli insetti che vivono nel terreno e sulla sua superficie. È efficace anche nei terreni umidi ed in quelli irrigui.

Il PERSHING si impiega per la difesa delle seguenti colture: **Barbabietola da zucchero, Mais, Cotone, Girasole, Patata, Cavoli a testa (escluso cavolo cappuccio) Cavoli ad infiorescenza, Cavoli a foglia (escluso cavolo cinese), Cavolo rapa, Solanacee (Pomodoro, Peperone, Melanzana), Ortaggi a bulbo (Cipolla, Aglio, Scalogno, Cipolline), Floreali ed Ornamentali.**

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il PERSHING è consigliato per la disinfestazione del terreno contro Elateridi (*Agriotes spp.*), Nottue (*Mamestra brassicae*, *Agrotis spp.*, ecc.), Grillotalpa (*Gryllotalpa gryllotalpa*), Maggiolino (*Melolontha melolontha*), Tipule (*Tipula spp.*), Bibio (*Bibio ortolani*), Mosca del cavolo (*Delia radicum*), Formiche (*Tatramorium spp.*, *Formica spp.*). PERSHING va distribuito in trattamenti localizzati alla dose di **8-12 kg/ha** per la patata, e **8-10 kg/ha** per le altre colture nei solchi preparati per la semina o per il trapianto. Su terreni molto leggeri si consiglia di attenersi alle dosi minime. Nella distribuzione del prodotto in miscela con concimi, è necessario che la granulometria dei singoli componenti non sia molto diversa; in caso contrario non si avrebbe una uniforme distribuzione dei prodotti.

COMPATIBILITÀ

Il PERSHING, data la sua formulazione granulare, non si applica in miscela con altri formulati.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

DA NON VENDERSI SFUSO

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

PERSHING (PFnPE)

GRANULARE

INSETTICIDA PER LA LOTTA CONTRO GLI INSETTI DEL TERRENO DA

APPLICARE PRIMA DELLA SEMINA

Meccanismo d'azione IRAC: 1B

PERSHING Registrazione del Ministero della Salute n. 12320 del 23/11/2004

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 31/01/2020; nel caso di concessione di proroga della scadenza del prodotto, la suddetta validità non potrà comunque superare il 02/05/2020

Composizione:

CLORPIRIFOS puro	g.	5
Coformulanti q.b. a	g.	100

Partita n.

Contenuto:
0,375-0,5-1-5 kg



ATTENZIONE

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via F.lli Bronzetti 32/28 - 24124 Bergamo

Tel. 035/19904468

Distribuito da:

BAYER CROPSCIENCE Srl, Viale Certosa 130, 20156 (MI) – Tel 02-3972 1

SIVAM S.p.A. - Via XXV Aprile, 4, 26841 Casalpusterlengo (LO) - Tel. +39 0377 8341

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):

Isagro S.p.A. – Via Nettunense Km. 23,400 – Aprilia (LT)

Bayer CropScience Srl - via delle Industrie, 9 - Filago (BG)

Sipcam S.p.A. - Via Vittorio Veneto 81 - 26857 Salerano sul Lambro (LO)

Stabilimento di confezionamento:

Sinapak Srl - Via dell'Industria e dell'Artigianato 7, 27049 Stradella (PV)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene anidride maleica. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali. Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo al solco. Durante le fasi di carico e applicazione, utilizzare guanti protettivi e abiti da lavoro. Durante la pulizia e la manutenzione delle apparecchiature utilizzare le stesse misure di protezione utilizzate durante l'applicazione. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici (di prima comparsa):** nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. **Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa):** astenia e paralisi muscolari. **Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali:** confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte:** generalmente insufficienza respiratoria. **Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).**

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. **Somministrare subito la pralidossima.**

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il PERSHING è un insetticida granulare per la lotta contro gli insetti che vivono nel terreno e sulla sua superficie. È efficace anche nei terreni umidi ed in quelli irrigui.

Il PERSHING si impiega per la difesa delle seguenti colture: **Mais, Patata, Cavoli a testa (escluso cavolo cappuccio) Cavoli ad infiorescenza, Cavoli a foglia (escluso cavolo cinese), Cavolo rapa, Solanacee (Pomodoro, Peperone, Melanzana), Ortaggi a bulbo (Cipolla, Aglio, Scalogno, Cipolline), Floreali ed Ornamentali (in campo).**

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il PERSHING è consigliato per la disinfestazione del terreno contro Elateridi (*Agriotes spp.*), Nottue (*Mamestra brassicae*, *Agrotis spp.*, ecc.), Grillotalpa (*Gryllotalpa gryllotalpa*), Maggiolino (*Melolontha melolontha*), Tipule (*Tipula spp.*), Bibio (*Bibio ortolani*), Mosca del cavolo (*Delia radicum*), Formiche (*Tatamorium spp.*, *Formica spp.*). PERSHING va distribuito in trattamenti localizzati alla dose di **8- 12 Kg/ha** per la patata, e **8-10 kg/ha** per le altre colture nei solchi preparati per la semina o per il trapianto. Su terreni molto leggeri si consiglia di attenersi alle dosi minime. Nella distribuzione del prodotto in miscela con concimi, è necessario che la granulometria dei singoli componenti non sia molto diversa; in caso contrario non si avrebbe una uniforme distribuzione dei prodotti.

COMPATIBILITÀ

Il PERSHING, data la sua formulazione granulare, non si applica in miscela con altri formulati.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO