

# TANGO MZ PLUS

Polvere bagnabile

Fungicida specifico per la lotta contro la Peronospora della vite, del pomodoro e della patata

Meccanismi d'azione: FRAC 4 (metalaxil) - FRAC M3 (mancozeb)

## Composizione

100 g di prodotto contengono:

METALAXIL-M puro	g 3,9
MANCOZEB puro	g 64
Coformulanti q.b. a	g 100

partita n.

taglie: **kg 1-2-5-10**

contiene: metenammina, dibutilnaftalensolfonato di sodio

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H361d Sospettato di nuocere al feto. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**PREVENZIONE:** P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.

**REAZIONE:** P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

**CONSERVAZIONE:** ---

**SMALTIMENTO:** P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare dell'autorizzazione:

**DIACHEM S.p.A. - Via Tonale 15 – 24061 Albano S. Alessandro (BG) – Tel. 0363 355611**

Officina di produzione: **DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)**

Distribuito da: **ARYSTA LIFESCIENCE ITALIA S.r.l. - Via Paracelso, 2 – 20864 Agrate Brianza (MB) -**

Tel. 039 9300304. **UPL ITALIA SRL – Via Terni, 275 - S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547/661523**

**Registrazione Ministero della Salute n. 14332 del 20.10.2008**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:

- 12 metri da corpi idrici superficiali per la vite

- 3 metri da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

## NORME PRECAUZIONALI


Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: metalaxil-m 3,9 % - mancozeb 64 % le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

**METALAXIL-M:** irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.

**MANCOZEB:** cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.



**ATTENZIONE**

## ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

**N.B.:** effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.

Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni.

## CARATTERISTICHE

TANGO MZ PLUS è un fungicida ad azione preventiva e curativa specificatamente indicato per la lotta contro le Peronosporaceae delle colture sotto indicate.

Il primo trattamento verrà eseguito dopo il verificarsi della prima pioggia infettante, per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permetterà di mantenere delle cadenze fisse sganciate dalle piogge. Infatti, anche piogge abbondanti e ripetute non diminuiscono l'efficacia del trattamento, né richiedono la necessità di ridurre l'intervallo tra le applicazioni. La traslocazione acropeta e basipeta del TANGO MZ PLUS consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento e l'altro.

## DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Colture	Parassiti	Dosi g/hl	Dosi kg/ha	Applicazione
VITE (pieno campo)	Peronospora ( <i>Plasmopara viticola</i> )	250	2,5	4 trattamenti a cadenza di 10 gg
POMODORO (pieno campo)	Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> )	250	2,5	4 trattamenti a cadenza di 7 gg
PATATA (pieno campo)	Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> )	250	2,5	4 trattamenti a cadenza di 10 gg

**Effettuare il trattamento non appena si verificano le condizioni sufficienti a promuovere l'infezione primaria.**

Volumi di riferimento per irroratrici a volume normale: 1000 l/ha. Per volumi di irrorazione inferiori al volume di riferimento, da utilizzarsi con attrezzature a basso/ultrabasso volume, mantenere la dose massima di 2,5 kg/ha.

Adattare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura delle colture trattate, evitando lo sgocciolamento della vegetazione.

Avvertenza: qualora si verificasse una non efficacia del trattamento determinata dalla selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.

Non impiegarlo mai su vivaia di vite.

**COMPATIBILITÀ:** In caso di miscela estemporanea con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità fisico-chimica.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA:** VITE: 28 GIORNI, POMODORO: 7 GIORNI, PATATA: 21 GIORNI.

**UNA VOLTA APERTA LA CONFEZIONE UTILIZZARE TUTTO IL CONTENUTO.**

## ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI**

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**