

TIOFLOR WDG

Fungicida a base di Zolfo per la lotta all'oidio ed al mal bianco di numerose colture

Tipo di formulazione: microgranuli idrodispersibili

- Zolfo puro (esente da Selenio) g. 80
- Coadiuvanti q. b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

Provoca irritazione cutanea. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Indossare guanti ed indumenti protettivi, proteggere gli occhi, il viso. In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Titolare della Autorizzazione:

Gowan Italia S.r.l. via Morgagni 68, 48018 Faenza (RA)

Tel. 0546/629911



Registrazione n. 11619 del 05.03.03 del Ministero della Salute

Officine di produzione:

RAG Additive GmbH – Werk Stulln – Werksweg 2 – Stulln (Germania)

STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Cotignola (RA)

SIPCAM OXON S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)

SULPHUR MILLS Limited – Mumbai (India)

ASCENZA AGRO S.A. - Setúbal (Portogallo)

QUIMETAL INDUSTRIAL S.A., Los Yacimientos 1301 – Maipú – Santiago – Chile

Officine di rietichettatura:

Arco Logistica SrL, via Battistella, 22 – 44133 Ferrara (FE)

BAM SrL, via Nuova Selice, 20 – 48017 San Patrizio Conselice (RA)

Taglie: kg 0.1-0.2-0.25-0.5-1-5-10-15-20-25

Partita n.: vedere sigla sovraimpressa



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il TIOFLOR WDG è un prodotto a base di Zolfo bagnabile finemente micronizzato in formulazione microgranuli idrodispersibili, impiegato nei trattamenti contro tutte le forme di Oidio e Mal Bianco con azione collaterale di contenimento nei confronti di altre malattie fungine quali Ticchiolatura, Ruggini e anche degli Acari in genere ed in particolare degli Eriofidi. Agisce per contatto ed il suo impiego deve essere preventivo o alla comparsa dei primi sintomi della malattia.

Dosi (ogni 100 litri di acqua):

Vite: trattamenti preventivi: 200-400 gr/hl. Trattamenti con forte pressione della malattia gr 600-800.

Pomacee: In pre-fioritura 500-600 gr/hl. In post-fioritura 200-300 gr/hl.

Drupacee: In pre-fioritura e dopo la raccolta 500-600 gr/hl. Dalla fioritura e durante l'accrescimento dei frutti 200-300 gr/hl.

Agrumi, Olivo, Nocciolo, Fragola: 200-500 gr/hl.

Cereali: intervenire alla comparsa della malattia sulle foglie apicali alla dose di 8 kg per ettaro.

Barbabietola da zucchero: 8 kg/ha. Eseguire 2 applicazioni: una alla comparsa della malattia ed una dopo 20 giorni.

Ortaggi, Patata, Girasole, Soia, Tabacco, Floreali e Ornamentali, Forestali, Vivai di Pioppo: intervenire preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi della malattia alla dose di 200-500 gr/hl. Sul Cetriolo impiegare alla dose massima di 200 gr/hl.

NB: a temperature elevate e alle alte dosi, il prodotto può risultare fitotossico. Si consiglia pertanto l'impiego alle dosi indicate nelle ore più fresche della giornata.

COMPATIBILITÀ: non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese ecc.), con olii minerali, con captano e diclofluanide. Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del captano.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: può arrecare danni alle seguenti cultivar di **Melo:** Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap, e di **Pero:** Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, Williams, Decana del Comizio. **Vite:** Sangiovese. **Cucurbitacee:** può essere fitotossico

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H):

CHEMTREC +1.703.527.3887

TIOFLOR WDG

Fungicida a base di Zolfo per la lotta all'oidio ed al mal bianco di numerose colture
Tipo di formulazione: microgranuli idrodispersibili

- Zolfo puro (esente da Selenio) g. 80
- Coadiuvanti q b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

Provoca irritazione cutanea. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Indossare guanti ed indumenti protettivi, proteggere gli occhi, il viso. In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.



ATTENZIONE

Titolare della Autorizzazione:

Gowan Italia S.r.l. via Morgagni 68, 48018 Faenza (RA)

Tel. 0546/629911



Registrazione n. 11619 del 05.03.03 del Ministero della Salute

Officine di produzione:

RAG Additive GmbH – Werk Stulln – Werksweg 2 – Stulln (Germania)

STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Cotignola (RA)

SIPCAM OXON S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)

SULPHUR MILLS Limited – Mumbal (India)

ASCENZA AGRO S.A. - Setúbal (Portogallo)

QUIMETAL INDUSTRIAL S.A., Los Yacimientos 1301 – Maipo – Santiago – Chile

Officine di rietichettatura:

Arco Logistica SrL, via Battistella, 22 – 44133 Ferrara (FE)

BAM SrL, via Nuova Selice, 20 – 48017 San Patrizio Conselice (RA)

Taglie: kg 0.1

Partita n.: vedere sigla sovraimpresa

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleeni.

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H):

CHEMTREC +1.703.527.3887

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO.**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**

TIOFLOR WDG PFnPE

Fungicida a base di Zolfo per la lotta all'oidio ed al mal bianco di numerose colture

Tipo di formulazione: microgranuli idrodispersibili

- Zolfo puro (esente da Selenio) g. 80
- Coadiuvanti q b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

Provoca irritazione cutanea. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Indossare guanti ed indumenti protettivi, proteggere gli occhi, il viso. In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Titolare della Autorizzazione:

Gowan Italia S.r.l. via Morgagni 68, 48018 Faenza (RA)

Tel. 0546/629911



Registrazione n. 11619 del 05.03.03 del Ministero della Salute

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/05/2020

Officine di produzione:

RAG Additive GmbH – Werk Stulln – Werksweg 2 – Stulln (Germania)

STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Cotignola (RA)

SIPCAM OXON S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)

SULPHUR MILLS Limited – Mumbai (India)

ASCENZA AGRO S.A. - Setúbal (Portogallo)

QUIMETAL INDUSTRIAL S.A., Los Yacimientos 1301 – Maipú – Santiago – Chile

Officine di rietichettatura:

Arco Logistica SrL, via Battistella, 22 – 44133 Ferrara (FE)

BAM SrL, via Nuova Selice, 20 – 48017 San Patrizio Conselice (RA)

Taglie: kg 0.1-0.2-0.25-0.5 Partita n.: vedere sigla sovraimpresa



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il TIOFLOR WDG PFnPE è un prodotto a base di Zolfo bagnabile finemente micronizzato in formulazione microgranuli idrodispersibili, impiegato nei trattamenti contro tutte le forme di Oidio e Mal Bianco con azione collaterale di contenimento nei confronti di altre malattie fungine quali Ticchiolatura, Ruggini e anche degli Acari in genere ed in particolare degli Eriofidi. Agisce per contatto ed il suo impiego deve essere preventivo o alla comparsa dei primi sintomi della malattia.

Dosi (ogni 100 litri di acqua):

Vite: trattamenti preventivi: 200-400 gr/hl. Trattamenti con forte pressione della malattia gr 600-800.

Pomacee: In pre-fioritura 500-600 gr/hl. In post-fioritura 200-300 gr/hl.

Drupacee: In pre-fioritura e dopo la raccolta 500-600 gr/hl. Dalla fioritura e durante l'accrescimento dei frutti 200-300 gr/hl.

Agrumi, Olivo, Nocciolo, Fragola: 200-500 gr/hl.

Cereali: intervenire alla comparsa della malattia sulle foglie apicali alla dose di 8 kg per ettaro.

Ortaggi, Patata, Floreali e Ornamentali, Forestali: intervenire preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi della malattia alla dose di 200-500 gr/hl. Sul Cetriolo impiegare alla dose massima di 200 gr/hl.

NB: a temperature elevate e alle alte dosi, il prodotto può risultare fitotossico. Si consiglia pertanto l'impiego alle dosi indicate nelle ore più fresche della giornata.

COMPATIBILITÀ: non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese ecc.), con olii minerali, con captano e diclofluanide. Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del captano.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: può arrecare danni alle seguenti cultivar di **Melo:** Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap, e di **Pero:** Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, Williams, Decana del Comizio. **Vite:** Sangiovese. **Cucurbitacee:** può essere fitotossico

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H):
CHEMTREC +1.703.527.3887

TIOFLOR WDG PF_nPE

Fungicida a base di Zolfo per la lotta all'oidio ed al mal bianco di numerose colture
Tipo di formulazione: microgranuli idrodispersibili

- Zolfo puro (esente da Selenio) g. 80
- Coadiuvanti q b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

Provoca irritazione cutanea. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Indossare guanti ed indumenti protettivi, proteggere gli occhi, il viso. In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.



ATTENZIONE

Titolare della Autorizzazione:

Gowan Italia S.r.l. via Morgagni 68, 48018 Faenza (RA)

Tel. 0546/629911



Registrazione n. 11619 del 05.03.03 del Ministero della Salute

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/05/2020

Officine di produzione:

RAG Additive GmbH – Werk Stulln – Werksweg 2 – Stulln (Germania)

STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Cotignola (RA)

SIPCAM OXON S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)

SULPHUR MILLS Limited – Mumbal (India)

ASCENZA AGRO S.A. - Setúbal (Portogallo)

QUIMETAL INDUSTRIAL S.A., Los Yacimientos 1301 – Maipu – Santiago – Chile

Officine di rietichettatura:

Arco Logistica SrL, via Battistella, 22 – 44133 Ferrara (FE)

BAM SrL, via Nuova Selice, 20 – 48017 San Patrizio Conselice (RA)

Taglie: kg 0.1

Partita n.: vedere sigla sovraimpresa

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H):

CHEMTREC +1.703.527.3887

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**